

4 Μαθηματικά

Γραμμ. απεικονίσεις

$$\begin{cases} T(x+y) = T(x) + T(y) \\ T(\lambda x) = \lambda T(x), \lambda \in \mathbb{R} \end{cases}$$

~~απ~~

$$y = ax \text{ στον } \mathbb{R}^2$$

↔ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

απ

$$T(x, y) = (x, y, x+y) \quad (\mathbb{R}^3)$$

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = (1, 0, 1)$$

$$A_T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (0, 1, 1)$$

---

Πυρήνας:  $N(A)$   
(Μηδενόχωρος)

$$\left\{ \vec{x} : \{ A\vec{x} = \vec{0} \} \right\}$$


$$\underline{2 \times} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A\vec{x} = \vec{0} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x + 6y = 0 \\ x + 3y = 0 \end{array} \right\}$$

$$\rightarrow y = -\frac{1}{3}x$$

$$\begin{pmatrix} k \\ -\frac{1}{3}k \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$



$$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

Form  $V: \mathbb{R}^2$

(vector space)

NORM

ΝΟΡΜΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

$$\|\vec{u}\| = \text{αριθμός.}$$

1)  $\|\vec{u}\| \geq 0$ , Αν  $\|\vec{u}\| = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = 0$

2)  $\|k\vec{u}\| = |k| \cdot \|\vec{u}\|$

3)  $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$

$$\|x\|_p = \left( \sum |x_i|^p \right)^{1/p}$$


πχ  $\|\vec{x}\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots}$

ΚΑΝΟΝΙΖΟΤΟΙΗΣΗ :  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\|\vec{u}\| = 7$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$$

$\vec{u}$  ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ =  $\begin{pmatrix} 6/7 \\ -3/7 \\ 2/7 \end{pmatrix}$







---

$$\|\vec{x}\|_1 = |x_1| + |x_2| + |x_3| + \dots$$

$$\|\vec{x}\|_\infty = \max |x_i|$$

(sup norm)

  
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ  
ΣΦΑΙΡΑ



# MATRIX NORMS:

$A^{m \times n}$

(ΝΟΡΜΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ)

- $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}}$  ( $\lambda =$  ιδιοτιμές)
- $\|A\|_1 =$  Μεγαλύτερο (απόλυτως) άθροισμα στήλων
- $\|A\|_\infty =$  Μεγαλύτερο (απόλυτως) άθροισμα γραμμών

$\frac{m \times n}{A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 \\ 2 & 7 & -1 \\ 3 & 6 & 4 \end{bmatrix}} \quad \|A\|_1 = 14$

$\|A\|_\infty = 13.$

ΚΑΙ  $\|A\|_F = \text{trace}(A^T A)$

(Frobenius norm)

(ΙΧΝΟΣ)

trace εως  $A^{n \times n}$  = αθροίσμα διαγωνίων  
στοιχείων

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 9 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{trace} = 12$$

$$A^T A = \text{τετραγων.}$$

Ερωζ. Γινόμενο

$$\left( \vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \right)$$

$$\boxed{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \text{αριθμός}}$$

Εστω  $V$  δ.χ.,  $\vec{u}, \vec{v} \in V$

$$\boxed{k, \lambda \in \mathbb{R}}: 1) \langle k\vec{x} + \lambda\vec{y}, \vec{z} \rangle = k \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \lambda \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$$

$$2) \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$$

$$3) \langle x, x \rangle \geq 0 \quad (Av = 0 \Rightarrow \vec{x} = \vec{0})$$

$\Delta x$  Ορίγω ορόν  $\delta x$ .  $C [0,1]$  (continuous)  
 (συνεχής συναρτήσεις)

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

Αν  $f(x) = \cos x$ ,  $g(x) = \sin x$  στο  $[-\pi, \pi]$

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin 2x}{2} dx$$

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$= \left[ -\frac{\cos 2x}{4} \right]_{-\pi}^{\pi} =$$

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \underline{\underline{0}}$$

Άρα  $f(x) \perp g(x)$

βάσει του  $\langle f, g \rangle$  που έβγα.

Πη 2:  $\langle A, B \rangle = \text{trace}(B^T \cdot A)$

$(A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}) = \text{αριθμός}$ .

για οχι?

$A \cdot B = \dots$   
οχι αριθμός

Αποστάση σε χώρους με norm:

$$d(x, y) = \|x - y\|$$

1)  $d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$

2)  $d(x, y) = d(y, x)$

3)  $d(x, y) \leq d(x, w) + d(y, w)$

NORM  $\rightarrow$  προέρχεται από  $\langle u, v \rangle$

Θεώρημα:  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$

Δ.Χ με νόρμα, η οποία επαίρεται  
από  $\langle x, y \rangle$  με ανόσωση  
ορίζομενη από νόρμα

ΠΛΗΡΗΣ Δ.Χ

(χώρος Hilbert)

4 ΥΠΟΧΡΟΥΣ:

$R(A)$

$N(A)$

$R(A^T)$

$N(A^T)$

ΜΗΔΕΝΟΧΩΡΟΣ

συνός  
(pivot)

Gauss

$$A: \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R(A^T) = (1, 3, 2)^T$$

$$R(A) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\dim(N(A)) + \dim(R(A)) = \text{συνός}$$

$$2 + 1 = 3$$


---

$$\begin{cases} R(A) = N(A^T)^\perp \\ N(A) = R(A^T)^\perp \end{cases}$$